



Unidad Urológica Hospital de Clínicas Caracas

Dr. Ariel Kaufman

Urología General e Infantil

Diplomado The American Board Of Urology

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS GENERALES **UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL**

- Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia al orinar, expulsión de fragmentos tales como costras, coagulos, etc.
- Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina durante los próximos días. Si el sangramiento persiste o aumenta en severidad (cantidad), contacte a su médico tratante.
- Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: fiebre de 38,5°C, mayor dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes o turbias. Si usted presenta alguno de estos síntomas contacte a su médico tratante.
- Si nota cambios en la herida operatoria como enrojecimiento, aumento del dolor, aumento de volumen o secreción, contacte a su médico tratante.
- Si usted va a ser egresado con una sonda vesical o de nefrostomía (en la vejiga o por el costado), asegúrese que nuestro personal le haya dado indicaciones acerca de los cuidados de la misma.
- Se recomienda ingerir abundantes líquidos.
- Si tiene dificultad para orinar, contacte a su médico tratante.

Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación al/los procedimiento(s) realizado(s) y sus resultados, contacte a su médico tratante.

GRACIAS

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

SI A USTED SE LE REALIZÓ(ARON) LA(S) SIGUIENTE(S)
INTEVENCIÓN(ES) QUIRÚRGICA(S):

Fimosectomía (Circuncisión)	Orquidectomía simple uni o bilateral
Cura de Varicocele ()Izq. ()Der.	Orquidectomía radical uni o bilateral
Cura de Hidrocele ()Izq. ()Der.	Nefrectomía simple ()Izq. ()Der.
Cura operatoria de Hipospadia	Nefrectomía Radical ()Izq. ()Der.
Orquidopexia ()Izq. ()Der.	Prostatectomía Retropúbica
Prostatectomía Radical	Cura operatoria Incontinencia Urinaria
Reimplante vesicoureteral Otra(s):	_____

INSTRUCCIONES UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL

Si su incisión se encuentra en el abdomen, ingle, región genital o en el costado, le recomendamos tomar las siguientes medidas o precauciones:

- Mantenga la herida cubierta durante las primeras 48 horas (post cirugía). Si su incisión tiene adhesivos Steristrip®, puede retirarlos 8 días después de la cirugía si no se han desprendido antes.
- No sumerja la incisión en bañera durante 8 días, lo mejor es la ducha.
- A partir de las 48 horas puede enjuagar la incisión con agua y jabón y al terminar secarla suavemente con una toalla suave.
- Puede aplicar Betadine® o Povidine® una vez al día después de la ducha.
- Para los mayores de 18 años es recomendable abstenerse de conducir vehículos durante dos a tres semanas.
- Evite realizar ejercicios físicos o levantar objetos pesados (más pesados que la guía telefónica de Caracas) durante cuatro semanas
- Caminar o subir escaleras está permitido mientras que no sean realizados en forma de ejercicio o actividad física

Cualquier cambio que aprecie a nivel de la incisión o zona cercana a la misma (enrojecimiento, secreción, aumento de volumen o de temperatura, aumento del dolor) deberá comunicarse a la brevedad con su médico tratante.

Si su incisión fue suturada con material de sutura absorbible, no hace falta retirarlo.

Si su incisión fue cerrada con sistema de grapas o con material de sutura no absorbible. Deberá acudir al consultorio el día estipulado por su médico tratante para que la enfermera proceda a retirar los puntos o grapas.

Si usted va a ser egresado con una sonda uretrovesical, de nefrostomía o con algún sistema de drenaje, asegúrese que el personal de enfermería le haya dado las instrucciones necesarias relacionadas con el cuidado de estos sistemas. Deberá acudir al consultorio de su médico tratante para retirarlos con previa cita.

Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia al orinar, expulsión de fragmentos tales como costras, coágulos, etc.

Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina durante los próximos días. Si el sangrado persiste, aumenta en severidad (cantidad) o le impide orinar contacte a su médico tratante.

Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: fiebre de 38,5°C o mayor, dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes o turbias. Si usted presenta alguno de estos síntomas, contacte a su médico tratante.

Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación al/los procedimiento(s) realizado(s) y sus resultados, contacte a su médico tratante.

GRACIAS.

INSTRUCCIONES POST PROCEDIMIENTO

SI A USTED SE LE REALIZÓ(ARON) EL(LOS) SIGUIENTE(S)
PROCEDIMIENTO(S):

BIOPSIA PROSTÁTICA
ESTUDIO URODINÁMICO
CATETERIZACIÓN URETRAL
INYECCIÓN PERIURETRAL
DE COLÁGENO
URETROGRAFÍA RETRÓGRADA

ESTUDIO VIDEOURODINÁMICO
ENDOSCOPIA URINARIA
INSTILACIÓN VESICAL
INYECCIÓN INTRACAVERNOSA
CISTOGRAFÍA MICCIONAL

INSTRUCCIONES UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL

- Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia al orinar en las próximas 24-48 horas. Si estos síntomas persisten, contacte a su médico tratante.
- Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina durante las próximas 48 horas después del procedimiento. Si el sangramiento persiste o aumenta en severidad (cantidad), contacte a su médico tratante.
- Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: Fiebre de 38,5°C o mayor, dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes o turbias. Si usted presenta alguno de estos síntomas, contacte a su médico tratante.
- Se recomienda ingerir abundantes líquidos.

- Si tiene dificultad para orinar, contacte a su médico tratante.

Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación a el/los procedimientos realizados y sus resultados, contacte a su médico tratante.

GRACIAS.